



Nom :

Date de début de traitement :

Attention, le temps de traitement peut varier en fonction de l'observance du patient et des mouvements dentaires obtenus.

TRAITEMENT ORTHODONTIQUE MULTIATTACHE – CONSEILS DURANT LE TRAITEMENT

Félicitation et bienvenue dans le monde de l'orthodontie.

Suivez attentivement les recommandations pour un traitement efficace et un résultat optimal.

- 1. Respecter les rendez-vous donnés par votre Orthodontiste afin de ne pas rallonger la durée du traitement. Les rendez vous sont la plupart du temps donnés entre 5 semaines et 2 mois.**
- Pendant tout le long du traitement, les aliments durs ou collants **sont interdits** afin d'éviter un décollement des bagues, un ralentissement des mouvements, et des séances au fauteuil plus longues. Tous ces facteurs peuvent contribuer à un allongement du temps de traitement.
- L'hygiène bucco-dentaire doit être irréprochable** afin de mener à bien le traitement, éviter les risques de caries autour des bagues, et empêcher un décollement de ces dernières.
Votre orthodontiste se réserve le droit de stopper, voir de ne pas continuer le traitement en cas d'hygiène déplorable.
- L'apparition de douleurs lors du début du traitement est tout à fait normal et peut se prolonger pendant plusieurs jours jusqu'à disparaître. La prise d'antidouleurs (doliprane) en début de traitement est fortement recommandée (sauf contre indications)**
- Veillez respecter attentivement les consignes de votre orthodontiste. Afin d'atteindre les objectifs de traitements **il est impératif de porter ses élastiques** sous peine d'allongement du traitement.

N'hésitez pas à contacter le cabinet ou nous envoyer un mail pour d'éventuelles questions.

